

Лабораторные и инструментальные исследования перед госпитализацией для ОПЕРАЦИИ НА АОРТЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЯХ

Действительны 14 дней

Лабораторные исследования:

- Общий анализ крови, включая тромбоциты.
- Анализ на время свертывания крови.
- Коагулограмма (МНО, АЧТВ, фибриноген, ПТИ).
- Биохимический анализ крови: мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, липидограмма.
- Общий анализ мочи.

Инструментальные исследования:

- ЭКГ в 12 отведениях (пленка + описание).
- Консультация кардиолога кардиохирургического отделения с результатами всех исследований.

Действительны 1 месяц

- Пациенты, страдающие сахарным диабетом - кровь на гликозилированный гемоглобин, консультация эндокринолога.
- Пациенты, имеющие заболевания щитовидной железы - кровь на тиреотропный гормон (ТТГ), консультация эндокринолога.
- Эзофагогастродуоденофиброскопия. При выявлении эрозивных и язвенных поражений желудочно - кишечного тракта необходимо пройти курс лечения по месту жительства и выполнить исследование повторно.
- При наличии сопутствующих заболеваний консультация врачей - специалистов, заключение об отсутствии противопоказаний к плановому оперативному лечению.

Действительны 2 месяца

- УЗИ органов брюшной полости и почек.
- Рентгенография органов грудной клетки (снимки и описание)
- Пациенты, страдающей патологией бронхолегочной системы — спирография, консультация пульмонолога.
- Эхокардиография
- Цветное дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей.
- Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру.
- Консультация невролога
- Консультация уролога (для мужчин), консультация гинеколога (для женщин).
- Консультация стоматолога, заключение о санации полости рта.

Действительны 6 месяцев

- Анализ крови на ВИЧ.
- Анализ крови на сифилис.
- Анализ крови на маркеры гепатитов В и С (ИФА).
- Группа крови, резус фактор.
- Цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.
- МСКТ-ангиография брахиоцефальных артерий, аорты и артерий нижних конечностей (при назначении сосудистым хирургом).
- МРТ головного мозга (при назначении неврологом).

НЕОБХОДИМО за 5 дней до госпитализации отменить препараты относящиеся к группам антикоагулянтов и дезагрегантов — Клопидогрель (Плавикс, Зилт, Эгитромб), Тиклопидин, Брилинта, Варфарин или его аналоги по согласованию с кардиологом или кардиохирургом. При отмене данных препаратов необходимо рассмотреть назначение низкомолекулярных гепаринов (Клексан, Фракисипарин).

Примечания:

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, результаты всех исследований согласно списку (+ копии всех исследований и выписных эпикризов, исследования на руки не возвращаются). Покрытие на ногтях запрещено.